

Riesgos del micofenolato en el embarazo

Información para pacientes



Información importante sobre el medicamento micofenolato

Si toma micofenolato y puede quedar embarazada, existen riesgos importantes que debe conocer.

Riesgos durante la concepción y el embarazo

- Aborto espontáneo
- Defectos congénitos: labio leporino, paladar hendido, deformidades en el oído externo, la cara y los órganos

Hable con su equipo de atención médica y tome estas medidas importantes para prevenir el embarazo:

1. Utilice un método anticonceptivo aceptable:

- Durante TODO el tiempo que esté tomando cualquier medicamento con micofenolato.
- Al menos 6 semanas **después de** suspender el micofenolato.

Opciones de anticonceptivos aceptables


Hable con su equipo de atención médica y elija entre las siguientes opciones anticonceptivas durante el tratamiento con micofenolato.

A

Opción 1: se puede usar solo
(elija una opción de A)

Más eficaz:


menos de 1 embarazo por cada 100 mujeres en 1 año



Dispositivo intrauterino (DIU)



Ligadura de trompas



Vasectomía

B

Opción 2: utilice terapia hormonal y de barrera (elija una opción de B y otra de C1 o C2, como puede ver a continuación)

4 a 7 embarazos por cada 100 mujeres en 1 año



Inyección solo de progesterona



Pastilla anticonceptiva



Parche anticonceptivo (progesterona)



Anillo vaginal



Implante de progesterona

IMPORTANTE:

Los medicamentos con micofenolato pueden disminuir la eficacia de las pastillas anticonceptivas y los anticonceptivos hormonales. Por lo tanto, TAMBIÉN DEBE utilizar un método de barrera, como condón o diafragma con espermicida, para evitar quedar embarazada.

C

Opción 3: utilice dos métodos de barrera
(elija una opción de C1 y otra de C2)

Menos eficaz:

13 o más embarazos por cada 100 mujeres en 1 año

1



Condón interno



Condón externo

2



Diafragma con espermicida



Esponja anticonceptiva



Capuchón cervical con espermicida

2. Hágase una prueba de embarazo confiable en el consultorio médico:

- **Antes** de comenzar el tratamiento con micofenolato
- Otra vez **de 8 a 10 días después de comenzar el tratamiento con** micofenolato
- Durante **las visitas de seguimiento de rutina** con su médico

3. Analice las opciones de anticoncepción de emergencia con su médico o el equipo de atención médica en caso de embarazo no planificado.

Informe a su médico inmediatamente si queda embarazada mientras está tomando micofenolato o durante las 6 semanas posteriores a la suspensión de este medicamento.

Informe de su embarazo al Mycophenolate Pregnancy Registry (Registro de embarazo de micofenolato).



En línea:

MycophenolateREMS.com

PSMycophenolateREMS.com



Por teléfono:

1-800-617-8191

1-877-310-4015

Si queda embarazada mientras toma micofenolato,
NO DEJE DE TOMARLO HASTA HABLAR CON SU MÉDICO

¿Está pensando tener hijos mientras está en tratamiento con micofenolato?

- Hable con su médico de inmediato.
- Siga usando un método anticonceptivo eficaz.
- Pregúntele a su médico acerca de otras opciones de tratamiento con menor riesgo para el embarazo que el micofenolato.
- Solicite una consulta con obstetra de alto riesgo (medicina materno-fetal) para obtener más asesoramiento.



Para obtener más información sobre los riesgos del micofenolato, visite MycophenolateREMS.com

Escanee aquí para ver una **consulta farmacéutica** sobre los riesgos del micofenolato.

Esta hoja informativa es proporcionada conjuntamente por la Escuela de Medicina Chobanian y Avedisian de la Universidad de Boston en asociación con Clinical Care Options, LLC. Su producción fue respaldada por una beca educativa independiente del Grupo Mycophenolate REMS y tiene por objetivo cumplir plenamente con los requisitos educativos de Mycophenolate REMS emitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).



Chobanian & Avedisian School of Medicine
Barry M. Manuel Center for Continuing Education



powered by CEA