

Mycophénolate: Risques pour la Grossesse

Informations Pour les Patientes



Informations importantes sur le mycophénolate

Si vous prenez du mycophénolate et qu'il est possible pour vous de tomber enceinte, il existe des risques importants que vous devez connaître

Risques pendant la conception et la grossesse

- Fausse-couche
- Malformations congénitales : fente labiale, fente palatine, malformations de l'oreille externe, du visage et des organes

Consultez votre équipe soignante et prenez ces mesures importantes pour éviter une grossesse:

1. Utilisez une méthode de contraception acceptable:

- durant TOUTE la période pendant laquelle vous prenez un médicament à base de mycophénolate
- pendant au moins 6 semaines **après** l'arrêt du mycophénolate

Méthodes de Contraception Acceptables


Discutez avec votre équipe soignante et choisissez une méthode de contraception parmi les suivantes pendant votre traitement par le mycophénolate

A

Option 1: peut être utilisée seul (choisissez un élément du groupe A)

La plus efficace :


moins d'une grossesse pour 100 femmes par année



Dispositif intra-utérin (DIU)



Stérilisation des trompes



Vasectomie

B

Option 2: utilisez des hormones et une barrière (choisissez une méthode du groupe B et une méthode du groupe C1 ou C2 présentés ci-dessous)

4 à 7 grossesses pour 100 femmes par année



Injection de progestérone seule



Pilule contraceptive



Patch contraceptif (progestérone)



Anneau aginal



Implant de progestérone

IMPORTANT:

Les médicaments à base de mycophénolate peuvent réduire l'efficacité des pilules contraceptives et des contraceptifs hormonaux. Par conséquent, vous DEVEZ ÉGALEMENT utiliser une méthode barrière, comme un préservatif ou un diaphragme avec un spermicide, pour éviter de tomber enceinte.

C

Option 3: utilisez deux méthodes barrières

(choisissez une méthode du groupe C1 et une méthode du groupe C2)

La moins efficace:

13 grossesses ou plus pour 100 femmes par année

1



Préservatif interne



Préservatif externe

2



Diaphragme avec spermicide



Éponge contraceptive



Cape cervicale avec spermicide

2. Rendez-vous chez votre médecin pour faire un test de grossesse fiable:
 - **Avant** de commencer à prendre le mycophénolate
 - Répétez le test de grossesse **8 à 10 jours après le début du mycophénolate**
 - Lors des visites **de suivi habituelles** avec votre médecin
3. Discutez des options de contraception d'urgence avec votre médecin ou votre équipe de soins pour prévenir les grossesses non planifiées

Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du mycophénolate ou pendant les 6 semaines qui suivent l'arrêt du mycophénolate

Déclarez votre grossesse au registre des grossesses sous mycophénolate



En ligne

MycophenolateREMS.com
PSMycophenolateREMS.com



Par téléphone

1-800-617-8191
1-877-310-4015

Si vous tombez enceinte alors que vous prenez du mycophénolate,
N'ARRÊTEZ PAS DE LE PRENDRE AVANT D'EN AVOIR PARLÉ À VOTRE MÉDECIN

Vous songez à fonder une famille alors que vous êtes sous traitement par le mycophénolate?

- Parlez-en immédiatement à votre médecin
- Continuez à utiliser une méthode de contraception efficace
- Demandez à votre médecin s'il existe d'autres options de traitement qui présentent moins de risques pour la grossesse que le mycophénolate
- Demandez à être orientée vers un service de médecine fœto-maternelle pour obtenir des conseils supplémentaires



Pour obtenir plus d'informations sur les risques liés au mycophénolate, consultez le site www.MycophenolateREMS.com

Scannez ici pour regarder une **consultation de pharmacien** sur les risques liés au mycophénolate.

Cette fiche pédagogique est fournie conjointement par la Chobanian & Avedisian School of Medicine de l'Université de Boston et Clinical Care Options, LLC. Sa réalisation a été soutenue par une subvention éducative indépendante du groupe Mycophenolate REMS. Elle a été conçue pour être en entière conformité avec les exigences pédagogiques du mycophénolate REMS telles qu'é émises par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



Chobanian & Avedisian School of Medicine
Barry M. Manuel Center for Continuing Education



powered by CEA