

霉酚酸酯妊娠风险 患者信息手册



重要的霉酚酸酯 药物信息

如果您服用霉酚酸酯并且可能怀孕，您必须了解以下重大风险。

受孕和怀孕期间风险

- 流产
- 出生缺陷：唇裂、腭裂、外耳、面部和器官畸形

与您的医疗团队交流并采取以下重要步骤来避孕：

1. 采用合适的避孕方案：

- 在您服用任何霉酚酸酯药物的整个期间
- 停用霉酚酸酯后至少 6 周

合适的避孕方案


与您的医疗团队交流，并在接受霉酚酸酯治疗期间挑选以下避孕方案

A


方案 1：可以单独使用
(从 A 中选择某项)

最有效：


1 年内每名女性怀孕次数少于 1 次



宫内节育器 (IUD)



输卵管结扎



输精管结扎


B

方案 2：使用激素和屏障 (从 B 中选择某项，**并**从 C1 或 C2 中选择某项，如下所示)

1 年内每 100 名女性怀孕次数 4-7 次



仅含孕针



避孕药



避孕
(黄体酮) 贴



阴道
避孕环



黄体酮
植入式避孕

重要信息：

霉酚酸酯药物会降低避孕药和激素避孕药的有效性。因此，您还必须使用屏障方法（例如含有杀精剂的阴道隔膜或避孕套）来避孕。

C

方案 3：使用 2 种屏障
(从 C1 中选择某项，**并**从 C2 中选择某项)

最无效：

1 年内女性怀孕次数 13 次以上

1



内用避孕套



外用避孕套

2



含有杀精剂



避孕
海绵



含有杀精剂的
宫颈帽

2. 通过您的医生办公室进行可靠的妊娠試驗：
 - 在开始使用霉酚酸酯**之前**
 - 在开始使用霉酚酸酯 **8-10 天重新** 进行妊娠試驗
 - 在**例行回診時**
3. 如果發生無保護性行爲，请与您的医生或医疗团队讨论紧急避孕方案

如果您在服用霉酚酸酯期间或在停用霉酚酸酯后 6 周内怀孕，请立即通知您的医生

向霉酚酸酯怀孕登记处 报告您的怀孕情况

網上



MycophenolateREMS.com
PSMycophenolateREMS.com



电话

1-800-617-8191
1-877-310-4015

如果您在服用霉酚酸酯期间怀孕，
在咨询医生之前请不要停用霉酚酸酯

在服用霉酚酸盐治疗期间考虑计划生育？

- 立即咨询您的医生
- 继续采用有效的避孕方案
- 向您的医生咨询比霉酚酸酯妊娠风险更低的其他治疗方案
- 请求转诊给母胎医学专家以便进一步咨询



有关霉酚酸酯风险的更多信息，请访问 www.MycophenolateREMS.com
扫描此处观看药剂师关于霉酚酸酯风险的咨询。

这份教育资料由波士顿大学 Chobanian & Avedisian 医学院与 Clinical Care Options, LLC 共同提供。其制作获得了霉酚酸酯 REMS 集团提供的独立教育补助金的支持，旨在完全遵从美国食品和药物管理局 (FDA) 发布的霉酚酸酯 REMS 教育要求。