

Rủi ro khi dùng Mycophenolate trong thai kỳ

Thông tin cho Bệnh nhân



Thông tin Quan trọng về Thuốc Mycophenolate

Nếu bạn dùng mycophenolate và có thể mang thai thì bạn phải biết về những rủi ro quan trọng.

Rủi ro khi thụ thai và mang thai

- Sảy thai
- Dị tật bẩm sinh: nứt môi, hở hàm ếch, dị tật tai ngoài, mắt và các cơ quan

Nói chuyện với nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn và thực hiện các bước quan trọng sau để tránh mang thai:

1. Sử dụng phương pháp tránh thai được chấp nhận:

- TRONG SUỐT thời gian bạn dùng bất kỳ loại thuốc mycophenolate nào
- Trong ít nhất 6 tuần **sau khi** ngừng sử dụng mycophenolate

Các lựa chọn biện pháp tránh thai được chấp nhận

Hãy nói chuyện với đội ngũ chăm sóc sức khỏe của bạn và chọn trong số các lựa chọn ngừa thai sau đây trong quá trình điều trị bằng mycophenolate


A

Lựa chọn

1: Có thể sử dụng riêng lẻ
(chọn một mục từ A)

Hiệu quả nhất:


Chưa đến 1 ca mang thai trên 100 phụ nữ trong 1 năm



Dụng cụ tránh thai trong tử cung (IUD)



Thắt ống dẫn trứng



Thắt ống dẫn tinh


B

Lựa chọn 2: Sử dụng Nội tiết tố và Rào chắn (chọn một từ B và một từ C1 hoặc C2 hiển thị bên dưới)

4-7 ca mang thai trên 100 phụ nữ trong 1 năm



Thuốc chích chỉ chứa progesterone



Viên uống thai



Miếng dán tránh thai (progesterone)



Vòng đạo



Cấy ghép rogestosterone

QUAN TRỌNG:

Thuốc Mycophenolate có thể làm giảm hiệu quả của viên uống tránh thai và thuốc tránh thai nội tiết tố. Do đó, bạn CŨNG PHẢI sử dụng phương pháp rào chắn — chẳng hạn như bao cao su hoặc màng ngăn có chất diệt tinh trùng — để tránh mang thai.

C

Lựa chọn 3: Sử dụng 2 Rào chắn
(chọn một từ C1 và một từ C2)

Ít hiệu quả nhất:

13 ca mang thai trở lên trên 100 phụ nữ trong 1 năm

1



Bao cao su bên trong



Bao cao su bên ngoài

2



Màng chắn có chất diệt tinh trùng



Miếng xốp ngừa thai



Nắp chụp cổ tử cung có chất diệt tinh trùng

- Thực hiện một xét nghiệm thử thai đáng tin cậy thông qua văn phòng người kê toa của bạn:
 - Trước khi** bắt đầu dùng mycophenolate
 - Làm lại xét nghiệm thử thai **8-10 ngày sau khi bắt đầu sử dụng** mycophenolate
 - Trong **các lần tái khám định kỳ** với người kê toa của bạn
- Thảo luận về các lựa chọn tránh thai khẩn cấp với người kê toa hoặc nhóm chăm sóc sức khỏe của bạn trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn

Thông báo cho người kê toa của bạn ngay lập tức nếu bạn có thai trong khi đang dùng mycophenolate hoặc trong 6 tuần sau khi ngừng mycophenolate

Báo cáo việc mang thai của bạn với Cơ quan đăng ký Thai kỳ Mycophenolate



Trên mạng

MycophenolateREMS.com

PSMycophenolateREMS.com



Qua điện thoại

1-800-617-8191

1-877-310-4015

Nếu bạn có thai trong khi đang dùng mycophenolate,
ĐỪNG NGỪNG DÙNG MYCOPHENOLATE CHO ĐẾN KHI BẠN NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI KÊ TOA CỦA BẠN

Cần nhắc sử dụng biện pháp kế hoạch hóa gia đình trong khi điều trị bằng Mycophenolate?

- Nói chuyện với người kê toa của bạn ngay lập tức
- Tiếp tục sử dụng một lựa chọn tránh thai hiệu quả
- Hỏi người kê toa của bạn về các lựa chọn điều trị khác có ít rủi ro cho thai kỳ hơn mycophenolate
- Yêu cầu giới thiệu đến chuyên khoa Y học Bào thai để được tư vấn thêm



Để biết thêm thông tin về rủi ro của mycophenolate, hãy truy cập
www.MycophenolateREMS.com

Quét vào đây để xem **tư vấn từ dược sĩ** về rủi ro của mycophenolate.

Tài liệu giáo dục này được cung cấp bởi Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine, hợp tác với Clinical Care Options, LLC. Việc chuẩn bị tài liệu được hỗ trợ bởi một khoản tài trợ giáo dục độc lập từ Tập đoàn Mycophenolate REMS và nhằm mục đích tuân thủ đầy đủ các yêu cầu giáo dục Mycophenolate REMS do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành.



Chobanian & Avedisian School of Medicine
Barry M. Manuel Center for Continuing Education



powered by CEA