Étude d'extension à long terme de phase III ALPINE sur le Zanubrutinib chez des patients atteints de LLC/SLL en rechute ou réfractaire.

Résultats préliminaires : Dans le cadre d'une étude de suivi à long terme, le zanubrutinib a continué à contrôler la leucémie lymphoïde chronique (LLC) et le lymphome lymphocytaire de petite taille (SLL) pendant de nombreuses années et a maintenu un profil d'innocuité stable, sans que de nouveaux problèmes d'innocuité n'apparaissent au fil du temps.

Objectif principal de l'étude et résumé : L'objectif principal de cette étude d'extension à long terme était de déterminer dans quelle mesure le zanubrutinib continuait à être efficace au fil du temps, en mesurant la survie sans progression, c'est-à-dire la durée pendant laquelle les patients vivaient sans progression de leur cancer.

Résumé : Le zanubrutinib a permis un contrôle durable de la maladie, avec un délai médian avant progression du cancer de 52,5 mois dans l'ensemble. Chez les patients présentant des caractéristiques à haut risque, telles que la délétion 17p, le délai médian avant progression de la maladie était de 49,9 mois, démontrant un bénéfice durable lors du suivi prolongé.

avec un délai médian avant progression du cancer de **52,5 mois** dans l'ensemble

Objectifs secondaires de l'étude et résumé : Les chercheurs ont également évalué l'évolution des réponses des patients au fil du temps et ont surveillé attentivement la tolérance à long terme.

Résumé : Le zanubrutinib a continué à maintenir la LLC/SLL sous contrôle chez de nombreux patients pendant plusieurs années. Certains patients ont continué à s'améliorer au cours du suivi à long terme, un petit nombre d'entre eux ayant obtenu des réponses plus profondes. Les données en matière d'innocuité sont restées cohérentes avec les rapports précédents, et les taux des principaux effets secondaires sont restés stables ou ont diminué au fil du temps. Un contrôle durable de la maladie a été observé dans tous les sous-groupes de patients, y compris ceux présentant des caractéristiques génétiques à haut risque.

Pour en savoir plus : Innocuité : Les effets secondaires les plus courants lors du traitement à long terme comprenaient des infections, une hypertension artérielle et une faible numération des globules blancs. Au cours du suivi prolongé, les taux d'effets secondaires sont restés stables ou ont diminué, et aucun nouveau problème d'innocuité n'a été identifié. Dans l'ensemble, le profil d'innocuité du zanubrutinib au fil du temps est resté cohérent avec les résultats précédents de l'étude ALPINE.



176 patients ont poursuivi le traitement par zanubrutinib à raison de **160 mg** deux fois par jour par voie orale

Détails de l'étude : Cette analyse provient d'une extension à long terme de l'étude de phase III ALPINE. Les patients atteints de LLC/SLL en rechute ou réfractaire qui avaient déjà reçu au moins un traitement antérieur et qui n'avaient jamais pris d'inhibiteur de BTK ont été inclus dans l'essai initial. Au total, 189 patients ont participé à l'extension et 176 ont poursuivi le traitement par zanubrutinib à raison de 160 mg deux fois par jour par voie orale. Les patients ont été suivis pendant une durée médiane de 54,2 mois, ce qui a permis d'évaluer les bénéfices et l'innocuité à long terme.

En termes simples : Chez les patients atteints de LLC/SLL en rechute ou réfractaire, le zanubrutinib a continué à contrôler la maladie pendant de nombreuses années et est resté bien toléré, sans nouveau problème d'innocuité observé au cours du suivi à long terme.

DECERA CLINICAL Education